單元 A2：函數

特定目標：

1. 將函數作爲學習其他數學單元的基本工具。
2. 繪畫及描述不同的函數。

內容	時間分配	教學建議
2.1 函數及其圖像	2	應教導學生認識清楚函數的定義，但函數的嚴格定義可不需深究，並可採用下列方式來說明函數的定義： $f : A \to B$ ，f 爲一由 A 至 B 的函數 假若 A 集中的每一元素均以某種方式匹配 B 集的唯一元素。A 集稱爲 f 的定義域，B 集稱爲 f 的值域。因函數 f 關係而對應于A集中元素 x 的 B集元素，通常用 f(x)表示，並稱爲 x 在函數 f 下的像。f [A]則稱爲 A 集在函數 f 下的像點集。在此，真值函數的意義須特別強調，因爲它們在本課程的其他單元中有廣泛使用，學生並須懂得如何繪畫函數的圖像。
2.2 函數的性質及運算	4	學生應該清楚知道內射、滿射和對射函數的定義，並能將它們分辨和將它們應用於解答有關問題。教師可採用下列提供的方法： 函數 $f : A \to B$ 爲 (i) 內射(一個對一個)若且僅若對集 A 中的元素 a_1、a_2，$a_1 \neq a_2$ 蘊涵 $f(a_1) \neq f(a_2)$，或者等價地，$f(a_1) = f(a_2)$ 蘊涵 $a_1 = a_2$； (ii) 滿射若且僅若 $f[A] = B$； (B 集之中的每一元素均爲 A 集之中某一元素的像點。) (iii) 對射(一一對應)若且僅若 f 爲一內射和滿射函數。 此時，教師應該已替學生在反函數 f^{-1} 的定義做好了預備，並可以推論出下列性質： f 爲一對射函數若且僅若其反函數 f^{-1} 存在。 再者，函數與其反函數(如存在的話) 的圖像僅爲直線 $y = x$ 上的反射。這個性質應利用足夠的例子來加以說明。

13

表示刪去的內容

內容	時間分配	教學建議
14		學生應懂得分辨奇函數、偶函數、週期函數、遞增和遞減函數。對於這些函數，應給予學生清楚的定義。至於遞增和遞減函數的定義，在未曾學習微分法之前，可採納以下提供的定義： (i) f(x) 爲一遞增函數(嚴格遞增)若且僅若 $x_2 > x_1$ 蘊涵 $f(x_2) \geq f(x_1)$ ($(f(x_2) > f(x_1))$； (ii) f(x) 爲一遞減函數(嚴格遞減)若且僅若 $x_2 > x_1$ 蘊涵 $f(x_2) \leq f(x_1)$ ($(f(x_2) < f(x_1))$。  f(x) 是嚴格遞增  f(x) 是嚴格遞減 這些性質對繪畫曲線和計算定積分均甚爲有用。 對於函數的運算，教師應與學生討論下列各點：設 f、g 爲函數，則 f +g、f –g、f × g 及 f/g (在考慮範圍下的所有 x，$g(x) \neq 0$) 均爲函數。 至於複合函數，因爲它們在微分學中對學習鏈式法則極爲重要，故需要給予學生足夠的例子，以便他們能夠掌握複合函數的概念。教師可引用以下例子，並列舉其他真值函數的例子作爲解釋。 若函數 $f : A \to B$ 及 $g : B \to C$ 則 f 與 g 的複合函數爲 $g \circ f : A \to C$ 及對 A 集內所有元素 x， $g \circ f(x) = g(f(x))$ 。

內容	時間分配	教學建議
15		
2.3 代數函數	2	學生應對下列的代數函數有所認識： (*a*) 多項式函數； (*b*) 有理函數 ； (*c*) 冪函數 x^{α}，其中α 爲有理數； (*d*) 由上述各函數的加、減、乘、除和複合而成的其他代數函數、例如 $\sqrt{x^2+1}$ 。
2.4 三角函數及其公式	14	學生應懂得繪畫六個三角函數及其反函數的圖像。下列有關三角函數的基本關係應與學生詳細討論： $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ $\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$ $\cot^2\theta + 1 = \mathrm{cosec}^2\theta$ 學生並應懂得三角函數在 $(\frac{n\pi}{2} \pm \theta)$時的化簡 (當 n 爲奇數或偶數)。其餘有關的應用和公式亦應一併教授。 (1) 複角公式 $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$ $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$

表示刪去的內容

內容	時間分配	教學建議
16		(2) 倍角公式 $\sin 2A = 2\sin A\cos A$ $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ $= 2\cos^2 A - 1$ $= 1 - 2\sin^2 A$ $\tan 2A = \dfrac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$ $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$ $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$ $\tan 3A = \dfrac{3\tan A - \tan^3 A}{1-3\tan^2 A}$ (3) 半形公式 $\sin^2\dfrac{A}{2} = \dfrac{1}{2}(1-\cos A)$ $\cos^2\dfrac{A}{2} = \dfrac{1}{2}(1+\cos A)$ $\sin A = \dfrac{2t}{1+t^2}$ ； $\cos A = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$ 其中 $t \equiv \tan\dfrac{A}{2}$ (4) 和及積公式 $\sin A + \sin B = 2\sin\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$ $\sin A - \sin B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\sin\dfrac{A-B}{2}$ $\cos A + \cos B = 2\cos\dfrac{A+B}{2}\cos\dfrac{A-B}{2}$

內容	時間分配	教學建議
17 **2.5 指數函數及對數函數**	6	$\cos A - \cos B = 2\sin\dfrac{A+B}{2}\sin\dfrac{B-A}{2}$ $\sin A\cos B = \dfrac{1}{2}(\sin(A+B)+\sin(A-B))$ $\cos A\sin B = \dfrac{1}{2}(\sin(A+B)-\sin(A-B))$ $\cos A\cos B = \dfrac{1}{2}(\cos(A+B)+\cos(A-B))$ $\sin A\sin B = \dfrac{1}{2}(\cos(A-B)-\cos(A+B))$ 其實；大部份公式均爲基本定義的引申，故此教師應鼓勵學生將它們證明出來，並討論將數式 a cos x + b sin x 轉變爲 r sin(x + α) 或 r cos(x + β)的方法。將上述各個公式應用在恒等式的證明和計算三角方程式的解亦應包括在課程內。 學生應對指數函數和對數函數之間互爲反函數的關係有所認識。對數的定義需加以溫習： $\log_a x = y$ 若且僅若 $x = a^y$ 其中 $a > 0$ 和 $a \neq 1$。 對於包含有變數 x 的對數函數，學生應知道它們其實祇是 logx 或函數 f(x)的對數函數而已。例如： $(\log_{10} x)^2$ 和 $\log_e(1+\tan x)$ 等。 對數函數的一些特性應加以學習。 設 $f(x) = \log_a x$ ，其中 $a > 0$ 和 $a \neq 1$； (i) f(x) 只在 $x > 0$ 上能夠定義； (ii) 當 $a > 1$ 時，f(x)是一遞增函數，而當 $0 < a < 1$ 時，f(x)是一遞減函數； (iii) 當 b、c > 0 及 $b \neq 1$ ， $\log_a c = \dfrac{\log_b c}{\log_b a}$ ； (iv) $f(a) = \log_a a = 1$ ； (v) $f(1) = \log_a 1 = 0$ 。

表示刪去的內容

內容	時間分配	教學建議
18		對於指數函數，應教導學生相應的處理方法。設 a 爲一正常數和 x 爲一變數，則函數 a^x 爲一指數函數。其特性爲： 設 $f(x) = a^x$　其中 $a > 0$ 和 $a \neq 1$， (i)　f(x) 對所有實數均可定義； (ii)　當 $a > 1$ 時，f(x)爲遞增函數而當 $0 < a < 1$，f(x)則爲遞減函數； (iii)　$f(0) = a^0 = 1$。 學生應懂得繪畫下列圖像： (i)　對數函數 $f(x) = \log_a x$　當 $a > 1$ 和 $0 < a < 1$ (ii)　指數函數　當 $a > 1$ 和 $0 < a < 1$ 在此時，教師可引領學生去擴闊他們在對數函數和指數函數的認識。 (i)　$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$ (ii)　$\lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}} = e$ 和 (iii)　$\log_e x = \int_1^x \frac{1}{t}\,dt$ 。 〔請注意 (iii) 僅爲對數函數的另一定義而已，$\log_e x$ 可寫爲 $\ell n\, x$ 〕 對數函數和指數函數的性質應予討論。 對數函數　$f(x) = \log_a x$　其中 $a > 0$，$a \neq 1$， (i)　$f(x) + f(y) = f(xy)$ (ii)　$f(x) - f(y) = f(\frac{x}{y})$ (iii)　$f(x^n) = nf(x)$

內容	時間分配	教學建議
19		指數函數　$g(x) = a^x$　其中 $a > 0$ (i)　$g(x + y) = g(x) \cdot g(y)$ (ii)　$g(x - y) = \frac{g(x)}{g(y)}$ (iii)　$g(nx) = (g(x))^n$ 至於函數 e^x 和 $\ell n\, x$ 在學習數學時的重要性應加以指出。
	28	

表示刪去的內容