

市民須對季節性呼吸道合胞病毒感染提高警覺

衛生署衛生防護中心發言人今日（三月三十一日）促請市民，尤其是家長、學校及院舍，須採取嚴謹的感染控制措施，預防由呼吸道合胞病毒（RSV）引起的呼吸道感染。

發言人說，呼吸道合胞病毒一般是在三月至四月開始至八月較為活躍。

他說，在截至三月二十二日的一週期間，公共衛生檢測中心共在60個樣本中檢測到該病毒；而該病毒的基線檢測為每星期少於20個樣本。

本年至今，衛生防護中心共接獲兩宗由呼吸道合胞體病毒引起的呼吸道感染院舍爆發報告，而二〇〇六年及二〇〇七年的數字分別為13及30宗，本年情況至今相約。

發言人說：「呼吸道合胞體病毒是呼吸道感染的常見起因。長者和五歲或以下的小童較容易受感染。」

該病是由與患者的分泌物直接接觸而傳播，在院舍環境中是較容易人與人之間傳播。

他說：「潛伏期由一至十日，通常為五至七日。一般病徵包括發燒、發冷、頭痛及胃口減退。」

市民應採取以下措施，預防由呼吸道合胞體病毒引起的呼吸道感染：

- * 維持良好的個人及環境衛生；
- * 保持雙手清潔，並用正確方法洗手；
- * 雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；
- * 打噴嚏或咳嗽時應掩著口鼻，並妥為清理口鼻排出的分泌物；和
- * 患病人士應避免與兒童或抵抗力低的人士接觸。

完

2008年3月31日（星期一）

香港時間20時28分