

Our Ref. : (75) in DH CDB/9/12/5 Pt.1

(6%) (76%) (18%)

37.5°C 2019 38°C



2019

及中學的受影響級別須停課五天以進行清潔。所有受停課影響的學生及員工須接受強制檢測，並有陰性檢測結果才能在復課後回校。由九月八日起，因學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案而須進行強制檢測的人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，以符合強制檢測的要求，而三歲以下幼童則可繼續以中心派發的樣本瓶收集糞便樣本進行檢測

(<https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/07/P2021090700845.htm>)。

學校應加強個人和環境衛生，並採取預防措施，以減低 2019 冠狀病毒病的傳播風險。請參閱“預防 2019 冠狀病毒病給學校的健康指引”，有關指引已上載至中心的網頁 (https://www.chp.gov.hk/files/pdf/advice_to_school_on_prevention_of_nid_chi.pdf)。

我們亦呼籲閣下注意各項體溫監測、手部衛生、佩戴口罩和保持社交距離措施，以及有關午膳安排及體育活動等部分。有關量度體溫的詳細資料可參閱衛生署衛生防護中心出版的「學校／幼稚園／幼稚園暨幼兒中心／幼兒中心預防傳染病指引」中第 2.3 章。

請提醒貴學校／院舍／機構的工作人員和學生注意正確潔手及正確使用口罩的指引。有關指引分別可在中心的以下專頁瀏覽 (<https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/460/19728.html> 及 <https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/460/19731.html>)。

此外，請向學生及員工推廣以下由中心製作關於個人和環境衛生的示範短片，有關短片已上載至中心的“感染控制須知”網頁 (<https://www.chp.gov.hk/tc/resources/346/index.html>)：

- 使用梘液及清水洗手
- 正確使用口罩
- 調校和使用稀釋漂白水的步驟
- 嘔吐物的處理
- 處理被污染的床單和衣物

我們亦建議採取以下措施以預防上呼吸道感染：

- 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；
- 在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衛生；
- 避免觸摸眼睛、口和鼻；
- 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

- 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；
- 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻；，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；
- 保持室內空氣流通；
- 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及
- 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

如察覺 貴學校／院舍／機構的學童、院友或工作人員出現發燒／呼吸道感染病徵的人數有所增加，請盡早通知衛生防護中心（電話號碼：2477 2772，傳真號碼：2477 2770），以便盡早進行流行病學調查及控制措施。

衛生署衛生防護中心總監



(張竹君醫生 代行)

二零二一年九月二十四日