傳 染 病 處

衞生防護中心
Centre for Health Protection
保障市民健康
Protecting Hong Kong's health

Communicable Disease Branch

本署檔號 Our Ref. : (83) in DH CDB/8/76/1
來函檔號 Your Ref :
電 話 Tel. :
傳 真 Fax No. :

致校長/負責人：

提高警覺預防基孔肯雅熱

衞生署衞生防護中心（中心）現特函通知閣下基孔肯雅熱近期在全球多地及香港鄰近地區（包括廣東省）錄得案例急升。由於市民在暑假期間會較頻繁外遊，香港出現輸入個案的風險相當高。加上隨着夏季氣溫及雨量上升，本港蚊患情況預料會加劇，出現本地傳播的風險也增加。中心呼籲貴機構提高警覺預防基孔肯雅熱，並提醒員工／學生不論在本地或外遊（尤其到受影響地區）時，都應時刻做好防蚊控蚊及個人保護措施。

截至二零二五年六月初，今年全球已有14個國家/地區報告約22萬宗個案及80宗死亡個案。而亞洲亦錄得超過3.3萬宗個案，主要集中在印度、斯里蘭卡和巴基斯坦。

截至七月二十七日，廣東省佛山市已錄得超過5,100宗個案，大部分個案（約90%）在順德區錄得。全部均為輕症病例，沒有嚴重或死亡個案。此外，廣東省其他城市（包括廣州、中山、東莞、珠海及深圳等），近日亦出現確診個案。截至七月二十八日，澳門亦錄得五宗基孔肯雅熱輸入個案，其中四名患者於潛伏期內曾到佛山市。

基孔肯雅熱是透過帶有基孔肯雅熱病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。患者會出現發燒和嚴重關節痛。其他常見症狀包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。症狀一般持續數天。但有些患者的關節痛可能會持續數月，甚至數年。由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，並多數與其他已存在的健康問題有關。大部分患者可以完全痊癒。在偶爾的情況下，基孔肯雅熱病毒可引起眼、心臟及神經的嚴重併發症。新生兒、長者及長期病患者出現重症的風險較高。

我們希望得到你的協助，透過防蚊滅蚊和採取個人預防措施保護自己免受蚊子叮咬，以預防基孔肯雅熱。中心呼籲貴機構採取以下措施，加強防止積水的工作及清除蚊子滋生的地方：

- 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；

衞生防護中心乃衞生署轄下執行疾病預防及控制的專業架構
The Centre for Health Protection is a professional arm of the Department of Health for disease prevention and control

- 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；
- 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；
- 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；
- 在雨季前把凹凸不平的地面填平；及
- 避免在叢林逗留。

市民於戶外活動期間，亦應做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。

職員/學生從受影響地區回來後14天內須繼續使用昆蟲驅避劑作為防蚊措施。若感到身體不適如發燒，應盡快求醫，並將行程細節告知醫生。

更多有關基孔肯雅熱的資料，請瀏覽衞生防護中心網頁 https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/6122.html。

衞生防護中心總監

(歐家榮 醫生代行)

二零二五年七月二十九日