

本署檔號 Our Ref. : (114) in DH CDB/8/76/1
來函檔號 Your Ref :
電 話 Tel. :
傳 真 Fax No. :

致校長／負責人：

香港首宗基孔肯雅熱本地個案

衛生署衛生防護中心（中心）現特函通知閣下中心於昨日（十月二十六日）錄得首宗本地感染基孔肯雅熱個案。中心呼籲大家提高警覺預防基孔肯雅熱，並提醒員工／學生不論在本地或外遊（尤其到受影響地區）時，都應時刻做好防蚊控蚊及個人保護措施。避免蚊子叮咬和防止蚊蟲滋生是有效預防基孔肯雅熱的方法。

個案資料

患者涉及一名82歲女性，於十月十八日出現左腳腳踝腫痛，十月二十二日出現發燒及手腳關節疼痛，同日向私家醫生求診，十月二十三日到廣華醫院急症室求醫，獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

流行病學調查顯示，住所位於黃大仙鳳德邨。病人在八月底曾到過廣東省清遠市，但在潛伏期不曾外遊。她的四名家居接觸者暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。中心已聯同食環署人員實地視察患者家居一帶的地點，進行病媒調查及滅蚊，減低本地傳播的風險。

中心在鳳德商場二樓設立了醫護站，為出現相關症狀的當區居民作評估。中心亦已設立查詢熱線（電話：2125 2373），曾到黃大仙鳳德邨附近一帶並出現宗基孔肯雅熱病徵的人士，可致電熱線尋求健康建議並按需要作適當跟進。



基孔肯雅熱是透過帶有基孔肯雅病毒的雌性伊蚊叮咬而傳染給人類。患者會出現發燒和嚴重關節痛。其他常見症狀包括肌肉疼痛、頭痛、噁心、疲倦和出現紅疹。症狀一般持續數天。但有些患者的關節痛可能會持續數月，甚至數年。由基孔肯雅熱所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，並多數與其他已存在的健康問題有關。大部分患者可以完全痊癒。在偶爾的情況下，基孔肯雅病毒可引起眼、心臟及神經的嚴重併發症。新生兒、長者及長期病患者出現重症的風險較高。

我們希望得到你的協助，通知師生注意防蚊滅蚊和採取個人預防措施保護自己免受蚊子叮咬，以預防基孔肯雅熱及其他蚊傳疾病。中心呼籲 貴機構採取以下措施，加強防止積水的工作及清除蚊子滋生的地方：

- 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞；
- 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵；
- 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內；
- 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟；
- 在雨季前把凹凸不平的地面填平；及
- 避免在叢林逗留。

市民於戶外活動期間，亦應做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。職員／學生若出現基孔肯雅熱病徵如發燒、關節痛、紅疹等，應盡快求醫。市民切勿自行用藥，尤其是阿司匹林或非類固醇消炎藥（如布洛芬），因這些藥物可能引起嚴重副作用，例如增加出血風險。

更多有關基孔肯雅熱的資料，請瀏覽衛生防護中心網頁 <https://www.chp.gov.hk/tc/healthtopics/content/24/6122.html>。

衛生防護中心總監

(歐家榮  醫生代行)

二零二五年十月二十七日