

本署檔號 Our Ref. : (6) in DH SEB CD/8/50/1 Pt.2

各位校長/幼兒中心負責人：

猩紅熱活躍度處於高水平

繼十一月十四日的信件，我現特函通知 貴校猩紅熱的最新本地情況。衛生署衛生防護中心留意到本港猩紅熱的活躍程度有所上升。猩紅熱的個案數字，由九月的 36 宗逐步上升至十月的 66 宗及十一月的 134 宗。在十二月(截至十二月十四日)，衛生防護中心錄得 53 宗個案。此外，截至目前為止，二零一二年錄得 31 宗院舍的猩紅熱爆發個案，包括 22 宗在幼稚園/幼兒中心及 9 宗在小學發生，共涉及 69 人。而每宗爆發個案涉及 2 至 4 人。

猩紅熱是一種傳染性高的疾病，主要由細菌引致。患者通常透過呼吸或直接觸受感染的呼吸系統分泌物而傳播。猩紅熱的症狀為發燒、咽喉痛及出疹。皮疹會在發病首天或翌日在軀幹或頸部出現，接着蔓延至四肢，特別是腋窩、肘部及腹股溝。典型的猩紅熱疹並不包括面部。該種皮疹的特點是患處皮膚粗糙。皮疹會在一星期後消退，手掌和腳底繼而會脫皮。隨猩紅熱併發的病症，有時還包括中耳感染和腎病。服用合適的抗生素可有效治療猩紅熱。如懷疑患上猩紅熱，應立即向醫生求診。

要預防猩紅熱，請注意以下措施：

- 維持良好的個人及環境衛生;
- 保持雙手清潔，並用正確方法洗手;
- 雙手被呼吸系統分泌物弄污後(如打噴嚏後)應立即洗手;
- 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物;
- 保持空氣流通; 及
- 患上猩紅熱的病人，不應上學或返回學校/幼兒中心，直至完全康復為止。



如察覺出現猩紅熱病徵的學童/職員人數或缺席人數增加，請盡早通知衛生防護中心(傳真號碼：2477 2770，電話號碼：2477 2772)。我們會就如何處理這些個案提供指引，並採取適當控制措施。如欲取得更多資料，可瀏覽衛生防護中心網站 (網址為<http://www.chp.gov.hk>)。

衛生署衛生防護中心總監



(張竹君醫生代行)

二零一二年十二月十八日